

Risultati questionario Vaccinazioni 2018

Campione:

I dati sono stati rilevati su un campione di 402 utenti, di cui:

Risultati campione	
Numero totale Uomini	38%
Numero totale Donne	62%

Età

Anni	Percentuale
Più di 60	52%
meno di 60	48%

Fumatore?

Risposte	Percentuale
Si	24%
No	76%

La percentuale dei fumatori nella fascia di età del campione compresa tra i 18 e i 40 anni (17%) è pari al 48%

La percentuale dei fumatori nella fascia di età del campione compresa tra i 40 e i 70 anni (56%) scende al 22%

Dagli intervistati che dichiarano di soffrire di una malattia (56%) emerge il dato che le patologie non sono mai isolate. La comorbilità è un fattore comune e chi soffre di BPCO, spesso ha anche cardiopatie o diabete.

1. Effettua la vaccinazione antinfluenzale?

Risposte	Percentuale
Si	41%
No	59%

- Nel 78% dei casi la vaccinazione è stata effettuata tra ottobre e novembre del 2017, prima del periodo di diffusione del virus influenzale

2. Ha effettuato la vaccinazione antipneumococcica?

Risposte	Percentuale
Si	16%
No	82%
Altro	2%

➤ Nel 65% dei casi la vaccinazione antipneumococcica è stata effettuata nell'ultimo triennio (2014/2017)

➤ Se no, ne ha mai sentito parlare?

Risposte	Percentuale
Si	35%
No	39%
Altro	26%

3. Se ha effettuato vaccinazioni, ha avuto effetti indesiderati?

Risposte	Percentuale
Si	16%
No	60%
Altro	24%

➤ Se sì, quali? (possibilità di risposte multiple)

Risposte	Percentuale
Stato febbrile	74%
Bronchite	16%
Polmonite	6%
Eruzioni cutanee	11%
Edema	1%
Altro	13%

4. Il suo medico ha consigliato vaccinazioni?

Risposte	Percentuale
Si	55%
No	45%

5. È favorevole alla vaccinazione antinfluenzale?

Risposte	Percentuale
Si	70%
No	30%

➤ Se sì, perché?

Il **42%** dei favorevoli ritiene che la vaccinazione aiuti a ridurre il rischio di contagio, quindi di diffusione del virus e si configuri come un mezzo di protezione per la collettività (lavoro) e per i soggetti più a rischio (anziani, bambini e cronici). Il **26%** ritiene che aiuti prevenire l'influenza e le sue complicanze e che sia un bene seguire le indicazioni ed i consigli dei medici che consigliano di vaccinarsi. Il **7%**, pur essendo favorevole, sottolinea che debbano vaccinarsi solo i soggetti più a rischio

➤ Se no, perché? (possibilità di risposte multiple)

Risposte	Percentuale
Non efficace	45%
Effetti collaterali	37%
Non adeguati studi	15%

6. Pensa ci sia adeguata informazione da Istituzioni, Media, Società Scientifiche o Industria Farmaceutica?

Risposte	Percentuale
Si	38%
No	62%

7. Ritieni che la farmacia o il MMG debbano avere ruolo maggiore nell'informazione?

Risposte	Percentuale
Si	76%
No	19%

La quota di chi soffre di BPCO sul totale del campione (402) è del 27% (107 persone). Di questi l'80% effettua la vaccinazione antinfluenzale (86 persone) e il 50% dichiara di effettuare anche quella antipneumococcica (53 persone)

Note e suggerimenti:

I rispondenti sottolineano la necessità di una maggiore informazione, sensibilizzazione e confronto sul tema, corredati da adeguati e più approfonditi studi scientifici che possano mettere in luce i vantaggi e le controindicazioni della vaccinazione (su campioni stratificati di popolazione). Si rileva il problema di notizie parziali, non scientifiche e sommarie sul tema da parte sia di coloro che sono favorevoli (fake news) sia da parte dei contrari (studi pilotati e di parte e speculazioni delle case farmaceutiche)