

Risultati

Indagine Aspettative Pazienti con BPCO (2019)

Campione:

I dati sono stati rilevati su un campione di **144** utenti, di cui:

Risultati campione		
Numero totale Uomini	85	59%
Numero totale Donne	71	41%
Totale	144	100%

Età

Anni	Numero	Percentuale
Più di 60	101	70%
meno di 60	43	30%
Totale	144	100%

L'età media calcolata sul totale del campione è pari a 65 anni

Fumatore?

Risposte	Numero	Percentuale
Si	35	24%
No	109	76%
Totale campione	144	100%

Città?

Risposte	Numero	Percentuale
Nord	46	32%
Centro	48	33%
Sud	50	35%
Totale campione	144	100%

Da quanto tempo ha avuto diagnosi di BPCO?

Anni	Numero	Percentuale
1 anno	15	10%
Più di 3	46	32%
Più di 5	83	58%
Totale	144	100%

1. Quanto ritieni adeguate le informazioni ricevute dal tuo Medico di Medicina Generale sulla tua malattia?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	80	56%
Abbastanza	54	38%
Molto	10	7%
Totale campione	144	100%

2. Quante ritieni adeguate le informazioni ricevute dallo specialista Pneumologo sulla tua malattia?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	24	17%
Abbastanza	66	46%
Molto	54	38%
Totale campione	144	100%

3. Quanto ritieni adeguate le informazioni ricevute dal tuo Medico di Medicina Generale sulla terapia che ti è stata prescritta?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	90	63%
Abbastanza	40	28%
Molto	14	10%
Totale campione	144	100%

4. Quanto ritieni adeguate le informazioni ricevute dallo specialista Pneumologo sulla terapia che ti è stata prescritta?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	27	19%
Abbastanza	59	41%
Molto	58	40%
Totale campione	144	100%

5. Quanto Ritieni adeguate le informazioni ricevute dal tuo Medico di Medicina Generale sull'utilizzo del dispositivo per inalazione (se applicabile)?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	83	58%
Abbastanza	29	20%
Molto	12	8%
Vuote	20	14%
Totale campione	144	100%

6. Ritieni adeguate le informazioni ricevute dal tuo specialista Pneumologo sull'utilizzo del dispositivo per inalazione (se applicabile)?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	32	22%
Abbastanza	45	31%
Molto	49	34%
Vuote	18	13%
Totale campione	144	100%

7. Cosa desidereresti di diverso/in più da parte del tuo Medico di Medicina Generale nella gestione della tua BPCO? (Possibilità di risposta multipla)

Risposte	Numero	Percentuale
Ascolto	41	28%
Informazioni sulla malattia	40	28%
Informazioni sulla terapia	39	15%
Informazioni sul dispositivo per inalazione	22	15%
Ruolo attivo e di guida	50	35%
Altro, specificare	9	6%
Totale campione	144	100%

8. Cosa ti aspetteresti di diverso/in più dalla consulenza dello specialista Pneumologo? (Possibilità di risposta multipla)

Risposte	Numero	Percentuale
Ascolto	27	19%
Informazioni sulla malattia	34	24%
Informazioni sulla terapia	28	19%
Informazioni sul dispositivo per inalazione	15	10%
Ruolo attivo e di guida	68	47%
Altro, specificare	18	13%
Totale campione	144	100%

9. Quanto ti ritieni soddisfatto dal trattamento ricevuto per la BPCO?

Risposte	Numero	Percentuale
Poco	21	15%
Abbastanza	84	58%
Molto	33	23%
Vuote	6	4%
Totale campione	144	100%

10. Esprimi il tuo grado di preferenza nei confronti delle diverse modalità di somministrazione dei trattamenti per la BPCO (punteggio da 1 a 5, dove 1=non preferito e 5=altamente preferito):

Risposte	1	2	3	4	5	Vuote	Totale campione
Orale	28% (41)	8% (11)	16% (23)	11% (16)	24% (35)	13% (18)	144
Aerosol	31% (44)	13% (19)	15% (22)	10% (14)	16% (23)	15% (22)	144
Spray	8% (12)	10% (15)	18% (26)	18% (26)	38% (55)	7% (10)	144
Polvere Secca	21% (30)	11% (16)	12% (17)	22% (31)	23% (33)	12% (17)	144

Relazione

Indagine Aspettative Pazienti con BPCO (2019)

L'indagine è stata condotta nel periodo tra luglio e ottobre 2019 per un totale di **144** arruolati, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale, per la maggioranza uomini (**59%**). Il **70%** del campione aveva più di 60 anni con una età media sul totale di 65.

Degli intervistati, il **66%** non era fumatore e nel **58%** dei casi è stata fatta diagnosi di BPCO da più di 5 anni, nel **32%** da 3 e solo nel **10%** dei casi la diagnosi era recente.

Dalle risposte ottenute, si deduce una scarsa informazione sulla patologia in oggetto, sulla terapia che viene prescritta, sull'utilizzo dei device e sulla disponibilità degli operatori sanitari ad affrontare le problematiche connesse con la patologia respiratoria.

Si sottolinea, inoltre, che solo il **38%** si è ritenuto abbastanza soddisfatto delle informazioni ricevute dal MMG e il **46%** dallo specialista pneumologo.

Una netta differenza si riscontra sulle informazioni ottenute a proposito della terapia prescritta, che è insufficiente nel rapporto con il MMG nel **63%** dei casi, mentre l'**81%** ritiene di aver avuto esauritive o sufficienti informazioni dallo specialista pneumologo.

Stesse considerazioni per quanto riguarda l'utilizzo dei device: solo il **28%** si ritiene abbastanza o pienamente soddisfatto delle informazioni ricevute dal MMG, mentre riguardo allo specialista questa percentuale sale al **65%**.

Per quanto concerne la terapia, si osserva che c'è ancora una significativa differenza a favore dello spray (**38%**) rispetto alla polvere secca (**23%**).

Infine, tra le osservazioni libere i pazienti dimostrano generalmente soddisfazione della comunicazione con il medico specialista e sottolineano la volontà di essere maggiormente informati sul decorso della malattia, sullo stile di vita da adottare e sulla riabilitazione respiratoria, con indicazioni di eventuali esercizi fisici da effettuare.

Si riafferma la criticità dell'accesso alle visite pneumologiche e nel caso di comorbilità dalla mancanza di coordinamento tra i vari specialisti.